

TECHNIQUES D'ALIMENTATION DANS LE CADRE D'UNE FENTE ORO-FACIALE

BIBERONS ET AUTRES TECHNIQUES D'ALIMENTATION

CHOIX DE LA TÊTINE



☐ Différentes formes de tétines en caoutchouc deuxième âge



☐ Biberon standard



☐ Tétine NUK spécial fente palatine

OU



☐ Tétine à embout "Y" de la marque Pigeon

☐ Biberon compressible

CHOIX DU BIBERON



☐ Biberon à cuillère rigide

BIBERONS COMPRESSIBLES



☐ Medela feeding specialness feeder



☐ Biberon compressible Mead Johnson Nutrition



☐ Méthode Kumagai : biberon pour pigeons avec tétine longue



☐ Biberons du Dr. Brown



☐ Biberon à cuillère souple - soft cup de la marque Medela



BIBERONS ET AUTRES TECHNIQUES D'ALIMENTATION

AUTRES TECHNIQUES D'ALIMENTATION




☐ Technique de la tasse




☐ Tire-lait de qualité hospitalière
(en cas de tire-allaitement à combiner avec un biberon)



☐ Plaque palatine (aide à l'alimentation)



☐ Sonde nasogastrique



☐ Gastrostomie
percutanée
endoscopique



POSTURES ET CONSEILS D'ALLAITEMENT

Recommandations de Boyce (2019) pour faciliter l'allaitement au sein :

Orientation et positionnement



Orientation de la fente labiale

Tenir le nourrisson de manière à ce que la fente labiale soit orientée vers le haut du sein

Positions selon le type de fente :

- **Fente totale unilatérale** positionner le sein vers le grand fragment (le côté où l'os est intact)
- **Fente palatine** : orienter le sein vers le bas afin qu'il ne soit pas poussé dans la fente palatine



Position de l'enfant avec FP ou FLP au biberon
(Woods, an educational guide for families, 2018)



Position « ballon de rugby » redressée
(ABM Clinical Protocol, Boyce et al., 2019)

Réduit le flux nasal et empêche la pénétration de lait dans l'oreille moyenne

Position face à face



Peut être efficace en cas de fente bilatérale

Position "Biological Nurturing"



Position semi-allongée, décontractée, avec contact ventral complet.


Gestes de soutien



Aide à la fermeture de bouche

Presser légèrement la fente labiale avec un doigt ou soutenir les joues

Compression du sein



Augmente l'afflux de lait en bouche pour faciliter la tétée

Soutien du menton du bébé pendant la tétée (ABM clinical protocole, Boyce et al., 2019)



Soutenir la mâchoire inférieure du bébé avec les doigts pour compenser le manque de tonus musculaire oro-facial et stabiliser la prise du sein

OBJECTIFS DES CONSULTATIONS ORTHOPHONIQUES CONCERNANT L'ALIMENTATION

- ☐ Dépistage de trouble alimentaire pédiatrique ou de difficultés concernant la prise alimentaire
- ☐ Guidance parentale sur l'alimentation
- ☐ Proposition d'adaptation du matériel et de la posture
- ☐ Suivi des difficultés alimentaires persistantes
- ☐ Conseils sur les textures et la diversification alimentaire
- ☐ Information sur la croissance et la nutrition

